



Indicaciones:

Está indicado en adultos, para el tratamiento de las siguientes infecciones:

- Neumonía adquirida en la comunidad.
- Infecciones de piel y tejidos blandos complicadas.

Para las infecciones arriba mencionadas Levofloxacin 5 mg/mL solución para perfusión solo debe utilizarse cuando el uso de los agentes antibacterianos recomendados habitualmente para el tratamiento de estas infecciones se considere inapropiado.

- Pielonefritis aguda e infecciones del tracto urinario complicadas.
- Prostatitis bacteriana crónica
- Ántrax por inhalación: para la prevención después de la exposición y para el tratamiento curativo.

Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antibacterianos.

Posología:

Levofloxacin solución para perfusión se administra mediante perfusión intravenosa lenta una o dos veces al día. La dosis depende del tipo y de la gravedad de la infección y de la sensibilidad del probable agente causal. El tratamiento con levofloxacin intravenoso, se puede completar con la presentación oral apropiada, de acuerdo con la ficha técnica de los comprimidos recubiertos con película y que se considere más adecuada para cada paciente individualmente. Dada la bioequivalencia de las formas parenteral y oral, se puede utilizar la misma dosis.

Contraindicaciones:

Levofloxacin solución para perfusión no se debe administrar:

- En pacientes con hipersensibilidad a levofloxacin u otras quinolonas.
- En pacientes con epilepsia.
- En pacientes con antecedentes de trastornos del tendón relacionados con la administración de fluoroquinolonas.
- En niños o adolescentes en fase de crecimiento.
- Durante el embarazo.
- En mujeres en periodo de lactancia.

Reacciones Adversas:

Frecuentes: insomnio, cefalea, mareo, flebitis, Diarrea, vómitos,náuseas, aumento de enzimas hepáticas, reacción en el sitio administración (dolor, enrojecimiento).

Poco Frecuentes: infecciones fúngicas incluyendo infección por candida, resistencia a patógenos, leucopenia,eosinofilia, anorexia, ansiedad, estado de confusión, nerviosismo, somnolencia, temblor, disgeusia,vértigo,disnea, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia, estreñimiento, aumento de bilirrubina en sangre, exantema, prurito, urticaria, hiperhidrosis, artralgia, mialgia, aumento de la creatinina en sangre, astenia.

Raras: Trombocitopenia, neutropenia, angioedema, hipersensibilidad, hipoglucemia particularmente en pacientes diabéticos, reacciones psicóticas, depresión, agitación, sueño anormal, pesadillas. Convulsiones, parestesia, alteraciones visuales tales como visión borrosa, tinnitus, taquicardia, palpitaciones, hipotensión, reacción fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos, erupción fija medicamentosa, trastornos del tendón, debilidad muscular, que puede ser especialmente importante en pacientes con miastenia gravis, insuficiencia renal aguda, pirexia, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética.

Precauciones y Advertencias:

Se debe evitar el uso de levofloxacin en pacientes que hayan experimentado con anterioridad reacciones adversas graves con el uso de medicamentos que contienen quinolonas o fluoroquinolonas. El tratamiento de estos pacientes con levofloxacin sólo se debe iniciar en ausencia de opciones terapéuticas alternativas y después de una evaluación cuidadosa de la relación beneficio-riesgo. Riesgos de resistencia S.aureus resistente a meticilina (SARM) con mucha probabilidad presenta co-resistencia a fluoroquinolonas, incluyendo levofloxacin. Por lo tanto no se recomienda levofloxacin para el tratamiento de infecciones por SARM conocidas o sospechadas a no ser que los resultados de laboratorio hayan confirmado la sensibilidad del organismo a levofloxacin (y los agentes antibacterianos recomendados habitualmente para el tratamiento de infecciones por SARM sean considerados inadecuados).

No te puede faltar

10%

Cuidado para la Familia

Rica Vitamina C 1000 mg Cont. 1 unidad

4

Gs. 2.836

Gs. 2.551

Itaú

AMERICAN EXPRESS

con 1

Gs. 2.551

Agregar al carrito

30%

Cuidado para la Familia

Tapaboca Quirurgico de 1 Pliegues T-Shield - Caja c unidades

9

Gs. 38.100

Gs. 21.000

Itaú

AMERICAN EXPRESS

con 2

Gs. 21.000

Agregar al carrito

40%

Cuidado para la Familia

Apelsin C Vitamina - Con Tabletas Efervescentes

40

Gs. 60.443

Gs. 36.266

Itaú

AMERICAN EXPRESS

con 1

Gs. 36.266

Agregar al carrito

15%

Cuidado para la Familia

Vitamina C Triple Inmuni Sabor Naranja - Caja de 3 sobres

23

Gs. 112.500

Gs. 91.000

Itaú

AMERICAN EXPRESS

con 1

Gs. 91.000

Agregar al carrito

40%

Cuidado para la Familia

Apelsin C + Zinc Eferves Sabor Naranja - Contiene tabletas

9

Gs. 72.763

Gs. 43.658

Itaú

AMERICAN EXPRESS

con 1

Gs. 43.658

Agregar al carrito

50%

Cuidado para la Familia

Multivitan 27 Plus - Caja comprimidos recubiertos

9

Gs. 139.900

Gs. 69.950

Itaú

AMERICAN EXPRESS

con 1

Gs. 69.950

Agregar al carrito

¡No te pierdas ninguna de nuestras ofertas!

Ingresá tu correo

Suscribirse

Menú

Factura electrónica

¿Quiénes Somos?

Blog

Políticas de Privacidad

Trabajá con Nosotros

Términos y Condiciones

Buscamos Alquileres

Encontranos

Novedades

Ganadores Mega Running 5k-10k V4

PROMOCIÓN “Llega el Verano”

PROMOCIÓN “FUERA ÑATI’U”

PROMOCIÓN “MAMÁ Y PAPÁ”

PROMOCIÓN “PROMO AMISTAD 2023”

PROMOCIÓN “TU BEBE MERECE LOLLY”

Como eliminar mi cuenta

Método de Pago

Nuestras Sucursales



61 61 000

\*6161 (desde todos los celulares)

contacto@puntofarma.com.py

Seguinos



Sitio web adaptado a la Ley N° 4868/13 de Comercio Electrónico - Decreto Reglamentario N° 1165/2014 | Ley N° 1334 Defensa al Consumidor - Autoridad de aplicación: Ministerio de Industria y Comercio - [www.mic.gov.py](http://www.mic.gov.py)

