



20% off



LASCA

 En stock

## Solax Furosemida 40 mg - Caja de 12 comprimidos

CÓD: 2452   CÓD BARRAS: 7840199030043



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 13.360

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 13.360

*\* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad** 1 

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:

**Descripción****INDICACIONES**

Hipertensión arterial. Edema de origen cardíaco (Insuficiencia cardíaca aguda o crónica), renal (Insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico), hepático, medicamentoso. Como coadyuvante en edema agudo de pulmón.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Diurético de asa. Sulfamoilbenzoato. Inhibe la reabsorción de electrolitos en la rama ascendente gruesa del asa de Henle.

Por vía oral: inicio de acción 30 minutos, máximo 1-2 horas, duración 6-8 horas.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Por vía oral, en ayunas. Más de una dosis, administrar la última antes de las 18-20 horas para no interferir con el descanso nocturno: 20-80 mg cada 8-12-24 horas.

En el tratamiento de la Insuficiencia cardíaca crónica, se pueden requerir dosis aún mayores.

## CONTRAINDICACIONES

Coma hepático. Hipokalemia, hiponatremia o deshidratación no tratadas.

## PRECAUCIONES

En Insuf. renal o hepática puede favorecer la descompensación metabólica. Hipotensión arterial. Uso simultáneo con otros agentes hipotensores. Gota. Diabetes. En tratamientos prolongados es aconsejable la valoración periódica de los niveles séricos de sodio y potasio. Puede evitarse la hipokalemia con suplemento o alimentos ricos en potasio, o asociando un diurético ahorrador de potasio.

La administración vía intravenosa debe hacerse lentamente. Uso cauteloso en el adulto mayor.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

Hipotensión arterial. Anorexia, náuseas, vómitos, epigastralgia, diarrea, estreñimiento, rara vez ictericia

## INTERACCIONES

## COMPOSICIÓN

Furosemida - 40 mg.

## Productos Relacionados




\$. 24.000

Ragilon Furosemida 20 mg/ml  
- Frasco de 15 ml



\$. 15.600

Ragilon Furosemida 40 mg -  
Caja de 10 comprimidos



\$. 14.400

Hidro Max Furosemide 40 mg  
- Caja de 10 comprimidos

Añadir al Carrito



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

## ¡Enterate de nuestras novedades!

y/o



### Call Center

Llámanos desde tu celular:

O escribinos al 0976580260



### Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

### Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

## Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

## Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165  
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.