




18% off



FAPASA

 En stock

Nabila ® Nebivolol 5 mg - Caja de 28 comprimidos

CÓD: 618346 CÓD BARRAS: 7730979091817



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

G. 142.278

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

G. 142.278

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad** 1 

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Betabloqueante beta 1 cardiosselectivo. Nebivolol o narbivolol. Posee efecto inotrópico y cronotrópico negativo y acción vasodilatadora por liberación de óxido nítrico a nivel endotelial. Carece de actividad simpaticomimética y de propiedades estabilizantes de membrana.

Descripción

INDICACIONES

Tratamiento de la hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias cardíacas. También se en la insuficiencia cardíaca.

POSOLOGIA

Por Vía. en dosis única diaria. Adultos: dosis habitual 5 ma. Puede aumentarse lueado de



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

PRECAUCIONES

Embarazo: 1er trimestre: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio; 2° y 3° trimestre: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales. Indicar labetalol, metoprolol o propranolol.

Evitar su discontinuación brusca. Angina de Prinzmetal. Coadministración con depresores del nódulo sinusal y nódulo AV. Pueden disminuir los síntomas de hipoglucemia en diabéticos. En insuficiencia renal los hidrosolubles requieren ajuste de dosis. Insuficiencia hepática. Disfunción sexual eréctil variable. Miastenia Gravis. Adulto mayor.

Hiperreninemia, coadministración con IECA puede provocar hipotensión arterial e insuficiencia renal; comenzar con dosis bajas. Coadministración con diuréticos ahorradores de potasio o anestésicos que deprimen la función miocárdica. Vigilar clínica de tirotoxicosis al suspenderlo.

CONTRAINDICACIONES

Bradicardia severa sintomática, bloqueo aurículoventricular de alto grado, insuficiencia cardíaca descompensada, shock cardiogénico. Insuficiencia vascular con dolor en reposo, fenómeno de Raynaud. Broncospasmo o asma. Depresión severa (propranolol). Estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral. Insuficiencia renal y hepática severa.

REACCIONES ADVERSAS

Por bloqueo beta2: broncoespasmo, extremidades frías, claudicación intermitente, menos frecuentes con cardiosselectivos. Bradicardia, bloqueo AV, Insuficiencia cardíaca. Depresión, confusión, insomnio. Fatigabilidad, disfunción sexual eréctil. Discontinuación brusca puede generar arritmias, cefaleas, temblores y ángor. Enmascaramiento de hipoglucemia en diabéticos insulino dependientes.

Aumento de triglicéridos. Tos seca. Cefalea, mareos, fatiga y parestesia. La asociación con calcioantagonistas puede disminuir su frecuencia. Raro: angioedema. Hipotensión arterial, especialmente al inicio. Hiperpotasemia. Oliguria e insuficiencia renal. Proteinuria, rash, disgeusia. Discrasias sanguíneas, neutropenia, agranulocitosis y anemia.

INTERACCIONES

Amiodarona, verapamilo, diltiazem potencian bloqueo de conducción AV, bradicardia y disfunción sistólica. Inductores del CYP1A2 y CYP3A4,5,7: reducen sus niveles plasmáticos, ver tabla de interacciones. Cimetidina o hidralazina incrementan los niveles plasmáticos. Prolonga la vida media de la lidocaína. Coadministración con anestésicos puede generar hipotensión, con insulina o sulfonilureas hipoglucemia. AINEs y salicilatos disminuyen su acción hipotensora. Incrementa las concentraciones plasmáticas de litio y digoxina.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Diuréticos tiazídicos y de asa potencian su efecto. Los AINEs pueden disminuir su efecto.
Diuréticos ahorradores de potasio o sales de potasio favorecen la hiperpotasemia.

COMPOSICIÓN

Nebivolol - 5 mg.

Productos Relacionados



\$. 61.418

Corentel 5 Bisoprolol
Fumarato 5 mg - Caja de 30

Agregar al Carrito

\$. 170.650

Nabila Nebivolol 10 mg - Caja
de 28 comprimidos

Ver detalles

\$. 139.154

Anfibol ® 5 mg Nebivolol -
Caja de 30 comprimidos

Agregar al Carrito

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.