




18% off



GADOR

 En stock

Tamoxifeno Gador 20 mg - Caja de 30 comprimidos


CÓD: 13840 CÓD BARRAS: 7792183106497



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo

Registrarme ahora >

Precio Cliente Fiel

₡. 114.103

* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo

Cantidad

-


1

+

Agregar al carrito

 Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Antiestrógeno.

Descripción

INDICACIONES

Tratamiento hormonal del cáncer de mama con receptores hormonales positivos, en mujeres post-menopáusicas. Primera línea de tratamiento hormonal como adyuvante en la enfcc precoz, o en enfermedad metastásica. También indicado en pre-menopáusicas con cánc. mamario y receptores hormonales positivos. Quimioprevención del cáncer mamario, en r es con riesgo incrementado.

ACCIÓN TERAPEÚTICA



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Posee acción antineoplásica por mecanismo de acción doble: bloqueo e inhibición de los receptores de estrógenos celulares y acción antitumoral directa, probablemente por bloqueo de la síntesis de ARN.

POSOLOGÍA

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente.

Por V.O., en ayunas, separado 1-2 hs de alimentos o alcalinos. Dosis habitual 20 mg por día, en una toma, que puede aumentarse a 40 mg en dos tomas.

CONTRAINDICACIONES

No co-administrar con warfarina o anastrozol. Antecedentes de tromboembolismo, trombosis venosa profunda, enfermedad coronaria, carcinoma de endometrio.

PRECAUCIONES

Embarazo: Categoría D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso. Lactancia: Contraindicado.

En la mujer pre-menopáusica puede inducir la ovulación, por lo que aumenta la posibilidad de embarazo. En terapia adyuvante combinada, iniciar una vez completada la quimioterapia y radioterapia, por potencial antagonismo. No administrar por más de 5 años consecutivos en la terapia adyuvante. Pacientes con reposo en cama prolongado (mayor riesgo tromboembólico). Ante sangrado vaginal buscar activamente el diagnóstico de cáncer de endometrio.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente náuseas, vómitos y tuforadas. Rara vez retención hidrosalina, sangrado vaginal y cefalea. Al inicio del tratamiento de la carcinomatosis ósea puede exacerbar dolores óseos e hipercalcemia. Aumenta riesgo de tromboembolismo venoso y carcinoma endometrial.

INTERACCIONES

Antagoniza el efecto de la ciclofosfamida. Disminuye las concentraciones plasmáticas de fenitoína. Disminuye significativamente su efecto con fluoxetina, paroxetina, sertralina, quinidina y bupropión. Con metotrexato se incrementa la toxicidad de ambos. Con citos. potencia el riesgo de accidentes tromboembólicos.

COMPOSICIÓN

Tamoxifeno - 20 mg



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Productos Relacionados

 <p>\$. 188.600</p> <p>Fiorigyn ® Dienogest 2,0 mg - Caja de 28 comprimidos</p> <p>Agregar al Carrito</p>	 <p>\$. 133.660</p> <p>Taxfeno Tamoxifeno 20 mg - Caja de 30 comprimidos</p> <p>Agregar al Carrito</p>
--	--

¡Enterate de nuestras novedades!

y/o



Call Center

Llámanos desde tu celular:



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Institucional

[Responsabilidad Social](#)

[Blog](#)

[Contacto](#)

Atención al cliente

[Sucursales](#)

[Términos y Condiciones](#)

[Métodos de pago](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Promociones

[B&C - BASA](#)

[B&C - UENO](#)

[B&C - SUDAMERIS](#)

[B&C - VISIÓN BANCO](#)

[B&C - Coofy](#)

[B&C - Coop. Ka'aru Pora](#)

[B&C - Promo Denis Roa](#)

Campañas

[Vacunación contra la Influenza](#)



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.