



20% off



LASCA

 En stock

# Clanzol Omeprazol 40 mg - Caja de 1 frasco ampolla

CÓD: 35550 Cód BARRAS: 7840199100838



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

G. 57.160

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

**G. 57.160***\* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad** 1 

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Polvo liofilizado para solución inyectable + 1 ampolla solvente de 10 ml.

Anticeluloso.

**Descripción****INDICACIONES**

Tratamiento del reflujo gastroesofágico y esofagitis en adultos y niños mayores de 12 años.  
Úlcera gastroduodenal. Tratamiento de la infección por *Helicobacter pylori*, como coadyuvante de antibióticos. Prevención de úlceras gastroduodenales por AINE. Síndrome de Zollinger-Ellison.

**POSOLOGIA**

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

## PRECAUCIONES

Embarazo y lactancia: Puede usarse.

Osteoporosis, antecedente de fractura previa. Nefritis intersticial aguda. Déficit de vitamina B12. Monitorear INR en uso concomitante con warfarina. Discontinuar uso entre 5 días y 2 semanas previo a la determinación de cromatogramina A, aumenta sus niveles. Insuf. hepática severa no exceder 20 mg/día. Seguridad y eficacia no demostrada en niños menores de 1 año. En niños de 1 a 11 años eficacia no establecida con dosis mayores a 1 mg/kg/día y por períodos mayores a 8 semanas.

## REACCIONES ADVERSAS

Diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, náuseas, vómitos. Infección por Clostridium difficile (uso prolongado). Pólipos fúndicos benignos. Déficit de vitamina B12, hipomagnesemia (uso prolongado). Nefritis intersticial aguda. Fracturas osteoporóticas. Lupus.

## INTERACCIONES

Se metaboliza fundamentalmente por CYP2C19 y es inhibidor de éste. Inhibidores de CYP2C19 (claritromicina y voriconazol) aumentan las concentraciones de omeprazol, mientras que inductores (rifampicina y hierba de San Juan reducen su concentración). Reduce la absorción de fármacos pH dependientes como posaconazol, erlotinib, ketoconazol e itraconazol.

Aumenta las concentraciones de digoxina, warfaria, cilostazol, diazepam, fenitoína, saquinavir, tacrolimus y metotrexato. Disminuye las concentraciones de clopidogrel.

## COMPOSICIÓN

Omeprazol - 40 mg

## Productos Relacionados



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Lomex D.U. Omeprazol 20mg  
- Caja de 7 cápsulas (2+1)

Agregar al Carrito

Antiul Esomeprazol 20 mg -  
Caja de 30 comprimidos

Agregar al Carrito

Antiul Esomeprazol 20mg -  
Caja de 20 comprimidos

Agregar al Carrito

## ¡Entérate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme



### Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

## Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

## Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

## Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165  
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.