




20% off



QUIMFA

En stock

## Oselta ® Oseltamivir 75 mg - Caja de 10 cápsulas

CÓD: 602632 Cód BARRAS: 7840213257555



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

G. 129.444

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

G. 129.444

*\* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad**

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Antiviral.

## Descripción

### INDICACIONES

Tratamiento de la gripe o influenza en adultos y niños a partir de los 6 meses, cuando el virus influenza está circulando en la población. Prevención de la gripe posexposición en adultos y niños mayores de 1 año, en menores de 1 año durante un brote pandémico. Iniciar tratamiento dentro de las 48 h del inicio de los síntomas o dentro de las 48 h siguientes a la exposición.

### POSOLOGIA

Por vía oral, con alimentos. Adultos y > 12 años: Tratamiento: 75 mg cada 12 h durante 5 días.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Pediatría: Tratamiento: < 1 año 3 mg/kg cada 12 h. En > 1 año: hasta 15 kg: 30 mg cada 12 h, 16-23 kg: 45 mg cada 12 h, 24-40 kg: 60 mg cada 12 h, más de 40 kg: 75 mg cada 12 h.

Profilaxis: en < 1 año: 2-3 mg/kg/día. En > 1 año: hasta 15 kg: 30 mg por día, 16-23 kg: 45 mg por día, 24-40 kg: 60 mg por día, mayores de 40 kg: 75 mg por día.

Insuficiencia renal severa (ClCr 10-30 mL/min): tratamiento 75 mg por día, profilaxis 75 mg cada 48 h.

## PRECAUCIONES

Embarazo: Categoría C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.

Insuficiencia hepática. Insuficiencia renal severa. Hemodiálisis. En insuficiencia renal ajustar dosis. Seguridad y eficacia no demostrada como tratamiento en menores de 2 semanas y como profilaxis en menores de 1 año, su uso en este grupo exige farmacovigilancia estricta. Tomar medidas de higiene para disminuir la transmisión viral, lavado de manos, protección de la tos.

## REACCIONES ADVERSAS

Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea, mareos, tos, insomnio, vértigos. Raras: anafilaxia, Síndrome de Stevens-Johnson, confusión mental, convulsiones, arritmias cardíacas, descontrol metabólico en diabetes mellitus, elevación de enzimas hepáticas.

## INTERACCIONES

No coadministrar con ibuprofeno.

## COMPOSICIÓN

Oseltamivir - 75 mg.

**¡Enterate de nuestras novedades!**

Ingresa tu correo electrónico

y/o



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Número de teléfono celular

Suscribirme



### Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



### Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

### Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

### Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

## Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165  
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.  
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.