




20% off



LIBIONS

 En stock

Limine ® Ondansetron 8 mg - Caja de 1 ampolla de 4 ml

CÓD: 821 Cód BARRAS: 7848002040098



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 66.056

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 66.056

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo***Cantidad**

- 1 +

Agregar al carrito



Agregar a mis favoritos

Compartir en:



Antiemético.

Descripción**INDICACIONES**

Prevención y tratamiento en adultos de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia o radioterapia. Prevención de vómitos y náuseas postoperatorios. Niños: náuseas y vómitos por quimioterapia a partir de los 6 meses y postoperatorio a partir del mes de vida.

Off label: gastroenterocolitis aguda con vómitos reiterados para facilitar la rehidratación y evitar la hidratación parenteral en pediatría y en la hiperemesis gravídica refractaria y severa.

POSOLÓGIA

Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

En cirugía: por vía I.M. o I.V. en 2-5 min dosis única de 8 mg; como prevención 30 min antes de terminar la cirugía, o 8 a 16 mg por V.O., una hora antes de la cirugía. Dosis máxima adultos 16 mg.

Pediatría: 0,15 mg/kg dosis máxima 8 mg.

CONTRAINDICACIONES

Coadministración con apomorfina (riesgo de hipotensión y pérdida de conocimiento).

PRECAUCIONES

Embarazo: Riesgo de defectos de cierre orofaciales (labio leporino, paladar hendido) por uso durante primer trimestre. Los informes postcomercialización describen casos de malformaciones congénitas; sin embargo, los informes son insuficientes para establecer una relación causal. No usar durante el primer trimestre. Valorar riesgo/beneficio en segundo y tercer trimestre.

Lactancia: Insuficiente evidencia. Se desconoce si se excreta en la leche. Valorar riesgo/beneficio.

Obstrucción intestinal subaguda. Insuficiencia hepática ajustar dosis, no exceder 8 mg por día. En insuficiencia renal y adulto mayor no requiere ajustar dosis. Portadores de QT prolongado. Monitoreo ECG en pacientes con disonías (hipomagnesemia, hipokalemia). Bradicardia o insuficiencia cardíaca.

REACCIONES ADVERSAS

Cefalea. Rubor. Estreñimiento. Visión borrosa. Vértigo. Prolongación del intervalo QT con riesgo de arritmias graves incluyendo torsade de pointes.

INTERACCIONES

Con apomorfina puede determinar hipotensión severa y pérdida de conocimiento. Su efecto es aumentado por dexametasona. Es metabolizado por CYP450 3A4, 2D6 Y 1A2. Su efecto es disminuido por carbamazepina, nevirapina, fenobarbital, fenitoína y rifampicina. Evitar fármacos que prolonguen el intervalo QT (eritromicina, ketokonazol, amiodarona, ác. nalidíxico, norfloxacin, formoterol, propafenona). Puede reducir el efecto analgésico del tramadol.

COMPOSICIÓN

Clorhidrato de ondansetrón - 8 mg



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

<p>Q. 37.600</p> <p>Egastal 8 Ondansetron 8mg / 4 ml - Caja de 1 ampolla de 4</p> <p>Agregar al Carrito</p>	<p>Q. 29.106</p> <p>Limine ® Ondansetron 4 mg - Caja de 1 ampolla de 2 ml</p> <p>Agregar al Carrito</p>
---	---

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.