




20% off



QUIMFA

 En stock

Oselta Oseltamivir 60 mg / 5 ml - Frasco de 75 ml

CÓD: 613492 CÓD BARRAS: 7840213255049



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo

[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 136.000

* Precio exclusivo para compras con pago en efectivo

Cantidad

-


1

+

Agregar al carrito

 Agregar a mis favoritos

Compartir en:

Extemporánea.

Descripción

Indicaciones

Antiviral activo frente al virus de la gripe, virus influenza subtipos A y B. Profármaco, su metabolito activo, carboxilato de oseltamivir, inhibe las neuraminidasas virales bloqueando la diseminación del virus.

Biodisponibilidad del 80% V/O alcanzando concentraciones similares en plasma y fluido cefalorraquídeo.

Metabolización principalmente por esterasas hepáticas. Eliminación renal en un 90% por lo que requiere ajuste de dosis en caso de ciada del filtrado glomerular.

Acción terapéutica



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Prevención de la gripe posexposición en adultos y niños mayores de 1 año, en menores de 1 año durante un brote pandémico.

Iniciar tratamiento dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas o dentro de las 48 horas siguientes a la exposición.

Posología

Por vía oral, con alimentos. Adultos y mayores de 12 años: Tratamiento: 75 mg cada 12 horas durante 5 días.

Profilaxis: durante 10 días luego del último contacto, en adultos 75 mg por día.

Pediatría: Tratamiento: menores de 1 año 3 mg/kg cada 12 horas por 5 días.

En mayores de 1 año: hasta 15 kg: 30 mg cada 12 horas, 16-23 kg: 45 mg cada 12 horas, 24-40 kg: 60 mg cada 12 horas, más de 40 kg: 75 mg cada 12 horas durante 5 días.

Profilaxis: durante 10 días luego del último contacto, en menores de 1 año: 2-3 mg/kg/día; mayores de 1 año: hasta 15 kg: 30 mg por día, 16-23 kg: 45 mg por día, 24-40 kg: 60 mg por día, mayores de 40 kg: 75 mg por día.

Insuficiencia renal severa (ClCr 10-30 mL/min): tratamiento 75 mg por día, profilaxis 75 mg cada 48 horas.

Precauciones

Insuficiencia hepática. Insuficiencia renal severa. Hemodiálisis. En insuficiencia renal ajustar dosis.

Seguridad y eficacia no demostrada como tratamiento en menores de 2 semanas y como profilaxis en menores de 1 año, su uso en este grupo exige farmacovigilancia estricta.

Tomar medidas de higiene para disminuir la transmisión viral, lavado de manos, protección de la tos.

Embarazo: Datos postcomercialización y estudios observacionales de consumo de oseltamivir en embarazadas no han demostrado toxicidad. Un estudio pequeño pudo observar una tendencia a posibles defectos cardíacos respecto a madres no tratadas (1.76 % vs 1.01%). En animales no han demostrado toxicidad. Evaluar riesgo/beneficio.

Lactancia: Evidencia insuficiente. Se excreta en la leche en cantidad no significativa. Evaluar riesgo/beneficio

Efectos secundarios

Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Cefalea, mareos, insomnio, vértigos. Tos.

Raras: anafilaxia, Síndrome de Stevens-Johnson, confusión mental, convulsiones, arritmias cardíacas, descontrol metabólico en diabetes mellitus, elevación de enzimas hepáticas.

Interacciones



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Composición

Oseltamivir 60 mg/5 ml.

Productos Relacionados



\$. 128.000

Disemid 75 mg Oseltamivir 75 mg - Caja de 10 cápsulas

Agregar al Carrito

\$. 145.200

Disemid Oseltamivir 60 mg / 5mL - Frasco suspensión de

Agregar al Carrito

\$. 68.060

Eurovir Aciclovir 400 mg - Caja de 15 comprimidos

Ver detalles

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.



Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Vacunación contra la Influenza



Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.