



20% off



PHARMETICA

 En stock

T4 ® Levotiroxina Sodica 100 mg - Caja de 50 comprimidos

CÓD: 2614 Cód BARRAS: 7840036000314



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

[Continuar](#)

Cliente No Fiel

₡. 26.160

 **Cliente Fiel:** Precio exclusivo

[Registrarme ahora >](#)

Precio Cliente Fiel

₡. 26.160

** Precio exclusivo para compras con pago en efectivo*

OPCIONES

TIRA - 10 COMP

CAJA - 50 COMP

Cantidad

- 1 +

Agregar al carrito

 Agregar a mis favoritos

Compartir en:   

Levotiroxina sódica.

Descripción

INDICACIONES

Hipotiroidismo o mixedema, congénito o de cualquier etiología. Cretinismo endémico o esporádico. Bocio simple, nodular o linfomatoso. Profilaxis de recidiva después de cirugía de bocio eutiroideo. Distopía tiroidea. Supresión de TSH hipofisaria en carcinomas tiroideos



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

POSOLOGÍA

La dosis se establecerá individualmente de acuerdo con el criterio médico y cuadro clínico del paciente.

Por vía oral, 30 min antes de la primer comida, con un vaso de agua.

Hipotiroidismo: inicio 25-50 mcg por día; mantenimiento 100-200 mcg por día.

Bocio eutiroideo benigno y profilaxis de recidiva de bocio: 75-200 mcg por día.

Supresión de TSH: 2.6 mcg/kg por día.

Pediatría: Hipotiroidismo congénito iniciar tratamiento precoz , procurando eutiroidismo antes de la 2ª semana de vida.

Por vía oral con agua o leche materna, en 1 toma: de 0-3 meses: 10-15 mcg/kg/día, 3-6 meses 8-10 mcg/kg por día, 6-12 meses: 6-8 mcg/kg por día, 1-5 años: 5-6 mcg/kg por día, 6-12 años: 4-5 mcg/kg por día, > 12 años: 1.7-3 mcg/kg por día.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia adrenal, hipertiroidismo e insuficiencia pituitaria no tratados. IAM. Miocarditis y pancreatitis agudas.

PRECAUCIONES

Embarazo: Categoría A: considerado segura a dosis habituales. No hay evidencia de riesgo fetal.

Lactancia: Probablemente segura a dosis habituales. Dosis para mantener el eutiroidismo bajo riesgo, a dosis altas con propósito inhibitor se debe valorar la función tiroidea del lactante.

Utilizar dosis inicial baja con aumento progresivo. Alergia al yodo. En > 65 años, cardiopatía, hipotiroidismo severo o larga evolución, diabetes.

REACCIONES ADVERSAS

Por hipertiroidismo secundario a dosificación acelerada o por sobredosis del fármaco: taquicardia, angor, trastornos del ritmo, debilidad muscular, calambres, hiperhidrosis, temblor, agitación, insomnio, diarrea, pérdida de peso, cefalea, trastornos menstruales. Síntomas no típicos: fiebre, vómitos, pseudotumor cerebri (niños).

INTERACCIONES

Resinas de intercambio, fármacos que contienen aluminio, hierro, carbonato de calcio y productos de soja disminuyen su absorción, por lo que se deben administrar de 2-5 hor diferencia con levotiroxina. Aumenta la acción de anticoagulantes orales, antidepresivos tricíclicos y anfetaminas, digitálicos, efedrina, epinefrina y metilfenidato.

Su acción es aumentada por salicilatos, cumarínicos, furosemide, clofibrato. Sertralina, cloroquina disminuyen su acción. Inductores enzimáticos disminuyen su concentración



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

cardiovascular de drogas adrenérgicas. Disminuye la acción de barbitúricos, anticonceptivos orales y colestiramina.

COMPOSICIÓN

Levotiroxina sódica - 100 mg.

Productos Relacionados

<p>₡. 43.952</p> <p>Synthroid Levotiroxina Sódica 125 mcg - Caja de 30 tabletas</p> <p>Agregar al Carrito</p>	<p>₡. 18.368</p> <p>Synthroid Levotiroxina Sódica 25 mcg - Caja de 30 tabletas</p> <p>Agregar al Carrito</p>	<p>₡. 22.878</p> <p>Synthroid Levotiroxina Sódica 50 mcg - Caja de 30 tabletas</p> <p>Agregar al Carrito</p>
---	--	--

¡Enterate de nuestras novedades!

Ingresa tu correo electrónico

y/o

Número de teléfono celular

Suscribirme



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Call Center

Llámanos desde tu celular:

Llamar ahora

O escribinos al 0976580260



Institucional

Responsabilidad Social

Blog

Contacto

Atención al cliente

Sucursales

Términos y Condiciones

Métodos de pago

Preguntas frecuentes

Promociones

B&C - BASA

B&C - UENO

B&C - SUDAMERIS

B&C - VISIÓN BANCO

B&C - Coofy

B&C - Coop. Ka'aru Pora

B&C - Promo Denis Roa

Campañas

Vacunación contra la Influenza



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.

Sitio web comercial adaptado a la Ley No. 4868/13 Decreto No. 1165
Cadena Farmacenter S.A.

Copyright © 2021 farmacenter.com.py. Todos los derechos reservados.



Usamos cookies para asegurarnos de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Al utilizar este sitio, estará de acuerdo con nuestras condiciones de uso.