

Buscar producto...

[Inicio](#) > [Medicamentos](#)

10%



SIN MARCA

Código: 38982



 7795378003595

 Disponible

~~Gs. 33.605~~

Gs. 30.245

Precio exclusivo para compras vía Web.

1

Agregar al carrito

4.2 ★ ★ ★ ★ ☆ 13 calificaciones

Donde Encontrar



Descuentos exclusivos



Gs. 21.844

Exclusivo con Tarj. de Crédito Itaú QR



Gs. 23.524

Exclusivo con Tarj. de Crédito Itaú



Gs. 23.524

Exclusivo con Tarj. de Crédito Itaú AMEX

Descripción

Indicaciones:

Como terapia de reemplazo o suplemento en pacientes con hipotiroidismo de cualquier etiología (excepto el hipotiroidismo transitorio durante la fase de recuperación de la tiroiditis subaguda): hipotiroidismo primario resultante de disfunción tiroidea, atrofia primaria, o ausencia parcial o total de la glándula tiroides, efectos de cirugía, radiación o drogas, con o sin la presencia de bocio; hipotiroidismo secundario (pituitario); e hipotiroidismo terciario (hipotalámico). Como supresora de la secreción pituitaria de tirotrófina (TSH) en el tratamiento o prevención de diversos tipos de bocios eutiroideos, incluyendo nódulos tiroideos, tiroiditis linfocítica subaguda o crónica (Hashimoto), bocio multinodular, y en conjunción con cirugía y terapia con yodo radiactivo en el manejo del carcinoma papilar tiroideo o folicular bien diferenciado TSH-dependiente.

Posología:

La dosis se ajustará al criterio médico y de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Con el objetivo de posibilitar un ajuste posológico adecuado a cada caso en particular, conforme al perfil hormonal y clínico del paciente, la levotiroxina sódica se presenta en comprimidos ranurados. En todos los casos el monitoreo periódico con dosajes de TSH y T4 permitirá optimizar el ajuste posológico. En el caso de los niños, los comprimidos ranurados podrán administrarse fraccionando la dosis apropiada y de no poder ser ingeridos en forma sólida, los mismos podrán disolverse con un poco de agua. La suspensión obtenida podrá administrarse con una cuchara o gotero. Para una mejor absorción intestinal del preparado se aconseja ingerirlo 30 minutos antes del desayuno. Deberá evitarse su administración conjuntamente con colestiramina, sales de hierro, magaldrato, sales de hidróxido de aluminio y/o magnesio, lovastatina, fibras dietéticas y/o laxantes, salvado y soja. De ser necesario el consumo de alguno de estos preparados, se aconseja realizarlo con 4 a 5 horas de diferencia de la ingesta de T4.

Contraindicaciones:

Pacientes con tirotoxicosis de cualquier etiología no tratada. Hipersensibilidad a las hormonas tiroideas o a alguno de los componentes del producto. (No hay evidencia bien documentada de alergia verdadera o reacciones de idiosincrasia a las hormonas tiroideas). Insuficiencia suprarrenal no controlada, ya que las hormonas tiroideas aumentan la demanda de hormonas adrenocorticales y pueden, por lo tanto, precipitar una insuficiencia suprarrenal aguda.

Reacciones Adversas:

Reacciones adversas diferentes de las indicativas de tirotoxicosis como resultado de sobredosis terapéutica (ya sea inicial o durante el período de mantenimiento), son raras. En infantes que reciben hormona tiroidea como terapia de reemplazo ha sido asociada la craneosinostosis con hipertiroidismo iatrogénico. La dosificación inadecuada del producto puede no resolver los síntomas de hipotiroidismo. Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad a los excipientes del producto, tales como rash y urticaria. Puede ocurrir una pérdida parcial del cabello durante los meses iniciales de la terapia, aunque es generalmente transitoria. Se ha reportado pseudotumor cerebral en pacientes pediátricos que recibieron hormona tiroidea como terapia de reemplazo.

Precauciones y Advertencias:

Las hormonas tiroideas, ya sean solas o asociadas con otros fármacos, no deben ser utilizadas en el tratamiento de la obesidad. En pacientes eutiroideos, la dosis dentro del rango de los requerimientos hormonales diarios son inefectivas para la reducción de peso. Dosis mayores pueden provocar manifestaciones tóxicas severas e incluso con compromiso de vida, en particular cuando se administran asociadas con aminas simpaticomiméticas con acción anorexígena (ej.: anfetaminas).

No te puede faltar

10%

Cuidado para la Familia

Rica Vitamina C 1000 mcg
Cont. 1 unidad

4

Gs. 2.836

Gs. 2.551

Itaú

compra

Gs. 2.551

Agregar al carrito

30%

Cuidado para la Familia

Tapaboca Quirurgico de 1
Pliegues T-Shield - Caja c
unidades

9

Gs. 38.100

Gs. 25.875

compra

Gs. 25.875

Agregar al carrito

40%

Cuidado para la Familia

Apelsin C Vitamina - Con
Tabletas Efervescentes

40

Gs. 60.443

Gs. 36.266

Agregar al carrito

15%

Cuidado para la Familia

Vitamina C Triple Inmuni
Sabor Naranja - Caja de 3
sobres

23

Gs. 112.500

Gs. 91.275

compra

Gs. 91.275

Agregar al carrito

40%

Cuidado para la Familia

Apelsin C + Zinc Eferves
Sabor Naranja - Contiene
tabletas

9

Gs. 72.763

Gs. 43.658

Agregar al carrito

50%

Cuidado para la Familia

Multivitan 27 Plus - Caja
comprimidos recubiertos

9

Gs. 139.900

Gs. 69.950

Agregar al carrito

¡No te pierdas ninguna de nuestras ofertas!

Ingresá tu correo

Suscribirse

Menú

[Factura electrónica](#)

[¿Quiénes Somos?](#)

[Blog](#)

[Políticas de Privacidad](#)

[Trabajá con Nosotros](#)

[Términos y Condiciones](#)

[Buscamos Alquileres](#)

Encontranos

[Nuestras Sucursales](#)

[61 61 000](#)

[*6161 \(desde todos los celulares\)](#)

contacto@puntofarma.com.py

Seguinos



Novedades

[Ganadores Mega Running 5k-10k V4](#)

[PROMOCIÓN "Llega el Verano"](#)

[PROMOCIÓN "FUERA ÑATI'U"](#)

[PROMOCIÓN "MAMÁ Y PAPÁ"](#)

[PROMOCIÓN "PROMO AMISTAD 2023"](#)

[PROMOCIÓN "TU BEBE MERECE LOLLY"](#)

[Como eliminar mi cuenta](#)

Método de Pago



Sitio web adaptado a la Ley N° 4868/13 de Comercio Electrónico - Decreto Reglamentario N° 1165/2014 | Ley N° 1334 Defensa al Consumidor - Autoridad de aplicación: Ministerio de Industria y Comercio - www.mic.gov.py

