ANEXO XII

Solicitud

De

Muestras

Asunción, 30 de marzo de 2020

NOTA CE N° 12 /2020

LIBRA PARAGUAY S.A.
Dr. Pedro Ciancio N° 1443
(021) 211 658
eolmedo@lablibra.com ; msosa@lablibra.com ;
infolibrapy@lablibra.com

Presente:

Ref.: "LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" - ID 373.874.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en el marco de la LPN de referencia, con el objeto de solicitar la presentación de las muestras de los ítems que se detallan a continuación:

LIBRA PARAGUAY S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia
1	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG INYECTABLE	Unidad	VIAL	Ácido Zoledrónico Libra 5 mg	Uruguay
9	IRINOTECAN 100 MG INYECTABLE	Unidad	AMPOLLA	Irinotecan Libra	Uruguay
12	NIMOTUZUMAB 50 MG INYECTABLE	Unidad	VIAL	CIMAher	Cuba
15	TEMOZOLAMIDA 100 MG	Unidad	UNIDAD	Temozolamida 100 Libra	Uruguay
17	TROMBOPOYETINA 15.000 U.I.	Unidad	CAJA	Zypotin - TPO 15.000 UI/ml	China/Uruguay

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado el día Miercoles **01 de abril de 2020, desde las 08:00 hasta las 09:30 horas**. **Transcurrido dicho plazo no se recibirá ninguna muestra.**

Para una mejor comodidad de los oferentes y una mayor eficiencia en la recepción y evaluación de muestras presentadas, el lugar de presentación de las mismas **será en la Planta Baja del Edificio de la DIBEN.**

Atentamente,

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Miembro del Comité de Evaluación

LIBRA

LIBRA PARAGUAY S.A

Nº Y NOMBBRE DEL LLAMADO:
LPN N° 01 "Adqusiición de Medicamentos Oncológicos y Generales"
ID: **373874**

LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS

Nº DE ITEM	CANTIDAD DE MUESTRA PRESENTADA	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA
1	1 frasco	Ácido Zoledrónico 5 MG Inyectable	Ácido Zoledrónico LIBRA 5 MG .	Uruguay
9	1 fraco	Irinotecan 100 MG Inyectable	Irinotecan Libra	Uruguay
12	1 ampolla	Nimotuzumab 50 MG Inyectable	CIMAher	Uruguay/Cuba
15	1 frasco x 5 capsulas	Temozolamida 100 MG Cápsula	Temozolamida 100 - Libra	Uruguay
17	1 frasco	Trombopoyetina 15.000 UI Inyectable	ZYPOTIN - TPO 15,000 UI/mL.	Uruguay/ China

Ezequiela de Mercedes Sosa
En calidad de apoderada

LIBRA PARAGUAY S.A.
02/04/20

LIBRA PARAGUAY S.A.
Ezq. Mercedes Sosa
C.I.Nº 771.508

Recibido
Abg. Nathalia Díaz
Jefa Interina del Dpto. de Licitaciones
DCP - DIBEN
01/04/2020
09:04

Asunción, 30 de marzo de 2020

NOTA CE N° 13 /2020

LABORATORIO BAGÓ DEL PARAGUAY S.A.
Avda. Mariscal López esq. Rca. Argentina (Edif. Torres de las Américas
Piso 10 Oficina A y B)
(021) 660 060
pablo@troche.com.py
Presente:

Ref.: "LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" - ID 373.874.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en el marco de la LPN de referencia, con el objeto de solicitar la presentación de la muestra del ítem que se detalla a continuación:

LABORATORIO BAGÓ DEL PARAGUAY S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia
19	ERITROPOYETINA 4.000 UI	Unidad	KIT-JUEGO	IRITROGEN	ARGENTINA

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado el día Miercoles **01 de abril de 2020, desde las 08:00 hasta las 09:30 horas**. **Transcurrido dicho plazo no se recibirá ninguna muestra.**

Para una mejor comodidad de los oferentes y una mayor eficiencia en la recepción y evaluación de muestras presentadas, el lugar de presentación de las mismas **será en la Planta Baja del Edificio de la DIBEN.**

Atentamente,

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Miembro del Comité de Evaluación

Asunción, 30 de marzo de 2020

NOTA CE N° 14 /2020

INSUMOS MÉDICOS S.A.
José Falcón 9557 entre 2 de Mayo y Cruzada de la Amistad
(021) 574 357 - (021) 591 849/50
imedic@imedic.com.py ; instituciones@imedic.com.py ;
licitaciones@imedic.com.py

Presente:

Ref.: "LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" - ID 373.874.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en el marco de la LPN de referencia, con el objeto de solicitar la presentación de las muestras de los ítems que se detallan a continuación:

INSUMOS MÉDICOS S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia
3	AZACITIDINA 100 MG INYECTABLE	Unidad	VIAL	MIELOZITIDINA	ARGENTINA
4	CABAZITAXEL 60 MG	Unidad	VIAL	ZITAT	ARGENTINA
5	DOXORRUBICINA LIPOSOMAL 20 MG INYECTABLE	Unidad	VIAL	DOXPLAX	ARGENTINA
7	ERLOTINIB 150 MG	Unidad	UNIDAD	TIRLEB 150	ARGENTINA
9	IRINOTECAN 100 MG INYECTABLE	Unidad	AMPOLLA	ITOXARIL 100	ARGENTINA
10	L-ASPARAGINASA 10.000 UI INYECTABLE	Unidad	VIAL	L-ASGINAN 10.000 UI	INDIA
11	LENALIDOMIDA 25 MG	CAJA	CAJA	LENALIDOMIDA 25mg LKM	ARGENTINA
14	PIRFENIDONA	Unidad	CAJA	PIRFENIDONA LKM	ARGENTINA
15	TEMOZOLAMIDA 100 MG	Unidad	UNIDAD	TOCITRAP 100mg	ARGENTINA

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado el día Miercoles **01 de abril de 2020, desde las 08:00 hasta las 09:30 horas**. **Transcurrido dicho plazo no se recibirá ninguna muestra.**

Para una mejor comodidad de los oferentes y una mayor eficiencia en la recepción y evaluación de muestras presentadas, el lugar de presentación de las mismas **será en la Planta Baja del Edificio de la DIBEN.**

Atentamente,

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Miembro del Comité de Evaluación

ORIGINAL

PLANILLA DE MUESTRAS

imedic
Insumos Médicos S.A.

Ítems del llamado LPN N° 01 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" con ID: 373874

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia
3	Azacitidina 100 MG Inyectable	Unidad	VIAL	10	20	MIELOZITIDINA	ARGENTINA
4	Cabazitaxel 60 MG Inyectable	Unidad	VIAL	8	16	ZITAT	ARGENTINA
5	Doxorubicina Liposomal Inyectable	Unidad	VIAL	40	80	DOXPLAX	ARGENTINA
7	Erlotinib 150 MG Comprimido	Unidad	UNIDAD	360	720	TIRLEB 150	ARGENTINA
9	Irinotecan 100 MG Inyectable	Unidad	AMPOLLA	60	120	ITOXARIL 100	ARGENTINA
10	L-Asparaginasa 10.000 UI Inyectable	Unidad	VIAL	50	100	L-ASGINAN 10.000UI	INDIA
11	Lenalidomida 25 MG Cápsula	Unidad	CAJA	8	16	LENALIDOMIDA 25mg LKM	ARGENTINA
14	Pirfenidona Cápsula	Unidad	CAJA	5	10	PIRFENIDONA LKM	ARGENTINA
15	Temozolamida 100 MG Cápsula	Unidad	UNIDAD	500	1.000	TOCITRAP 100mg	ARGENTINA

OBS: Se deja constancia de que para el Item N° 14 presenta DD JJ. de compromiso de entrega del producto.

01/04/2020
08:01

Recibí conforme muestras.
En fecha 02-04-2020.

imedic
INSUMOS MÉDICOS S.A.
Armando Benitez
C.I. N° 1.209.123
LICITACIONES

Insumos Médicos S.A.
R.u.c.: 80029801-2
e-mail:presidencia@imedic.com.py
Website:www.imedic.com.py

ORIGINAL

Fdo. De la Mora, 31 de marzo de 2.020

Señores
DIBEN
PRESENTE

En el marco de la LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales - Ad Referéndum a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2020 y al Plan Financiero 2020. ID Nº 373.874 en relación al **ITEM 14 – Pirfenidona / Marca Pirfenidona LKM / Procedencia Argentina** que nos comprometemos en carácter de Declaración Jurada entregar la muestra solicitada en la Nota CE N 14/2020 en fecha 15/04/2020 ya que nuestro proveedor de Origen nos manifestó que a la fecha no cuenta con la muestra ya que el producto está en fase terminal de producción y que estiman esa fecha estarían despachando en la Aduana de Asunción teniendo en cuenta que están teniendo problemas en los envíos ya que actualmente la Frontera con Argentina está cerrada.

No obstante, enviamos adjunto el catalogo del producto (Arte de Pirfenidona) además del prospecto del mismo.

Esperando una respuesta favorable a la solicitud, me despido atentamente.

Licitaciones

INSUMOS MEDICOS S.A.
Oscar León
C.I. Nº 4.254.304
Licitaciones

José Falcón Nº 9.557 casi Cruzada de la Amistad
F. de la Mora - Paraguay

Tele fax (021) 511 155
Tele fax (021) 574 357

LKM	**Producto:** Pirfenidona LKM x 270 cápsulas **Material:** Estuche **Medida:** 170 x 75 x 122.5 mm	**Papel:** Cartulina Triplex **Gramaje:** 390 g - Marca Maule + Laca UV exterior **Colores:** Process Black Pantone 300C, Pantone 032C
Escala 1:1 000000-R	**PHCode:** n/a	**LineCode :** XXXXXXX

000000-R

LKM
Absolutamente Confiable

VENTA BAJO RECETA
Industria Argentina

Pirfenidona LKM®
Pirfenidona 267 mg

270 CAPSULAS
USO ORAL

270 CAPSULAS
USO ORAL

Pirfenidona LKM®
Pirfenidona 267 mg

VENTA BAJO RECETA
Industria Argentina

LKM
Absolutamente Confiable

Formula cualicuantitativa
Cada cápsula contiene:

Pirfenidona	267.0 mg
Croscarmelosa sódica	10.0 mg
Celulosa Microcristalina pH 102	36.0 mg
Povidona K30	9.0 mg
Estearato de magnesio	3.0 mg

Presentación:
Envase conteniendo 270 cápsulas.
Conservación:
Debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15° y 30° C, en ausencia de luz, en su envase original.

Elp. Med. aut. por el M.S. Cert. N° 58069

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En **Uruguay**: representa, importa y distribuye: **CUFRE S.A.**
Montevideo 1445 oficina 1028 , Montevideo, Uruguay.
Reg. Imp. N° 467, Reg. Repr. N° 395,
Ley 15.443. Reg. M. S. P N°
D.T. Q.F. Beatriz Reves.
VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL.
Posología y modo de uso: ver prospecto adjunto.

Importado por: **LKM PARAGUAY S.A.**
Mariscal Lopez 1840 c/ Arecia, Paraguay.
C.E.Regional: Sara Noemi Burro Alpiero.
Reg. Prof. 1571 Reg. Sanitario N°

Elaborado por: **VICROFER S.R.L.**, Santa Rosa 3676, San Fernando, Prov. de Bs. As., Argentina.
Para: **Laboratorio LKM S.A.**
Lynch 3461/63, C.A.B.A., Argentina.
www.lkmsa.com
Dir. Tec.: Edoardo Ebruzzese - Farmacéutico.

LKM
Absolutamente Confiable

270 CAPSULAS
USO ORAL

Pirfenidona LKM®
Pirfenidona 267 mg

VENTA BAJO RECETA
Industria Argentina

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO

"Este medicamento debe ser administrado solo bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica."

"Este medicamento ha sido prescripto solo para su problema médico actual. No se lo recomiende a otras personas."

CUFRE/LKM
Pirfenidona 267 mg
64251S-1

PIRFENIDONA LKM®
PIRFENIDONA 267 mg

LKM

Cápsulas
Venta Bajo Receta
Industria Argentina

FORMULA CUALI-CUANTITATIVA:
Cada cápsula contiene:

Pirfenidona	267,0 mg
Croscarmelosa sódica	10,0 mg
Celulosa Microcristalina pH 102	36,0 mg
Povidona K30	9,0 mg
Estearato de magnesio	3,0 mg

ACCION TERAPEUTICA
Inmunosupresor

Código ATC: L04AX05

INDICACIONES
Está indicado en adultos para el tratamiento de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI).

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Acción farmacológica
El mecanismo de acción de pirfenidona no se conoce bien todavía. Sin embargo, los datos disponibles indican que pirfenidona tiene propiedades tanto antifibróticas como antiinflamatorias en una serie de sistemas in vitro y en modelos animales de fibrosis pulmonar (fibrosis inducida por bleomicina y trasplante).
La FPI es una enfermedad pulmonar fibrótica e inflamatoria crónica que se ve afectada por la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la interleucina-1 beta (IL-1β), habiéndose demostrado que pirfenidona reduce la acumulación de células.
El aclaramiento de pirfenidona por vía oral parece ser modestamente saturable. En un estudio de dosis múltiples y determinación de dosis, realizado en adultos sanos de más edad, se administraron dosis de entre 267 mg y 1.335 mg tres veces al día y el aclaramiento medio disminuyó en casi el 25% por encima de una dosis de 801 mg tres veces al día. Tras la administración de una dosis única de pirfenidona en adultos sanos de más edad, la semivida de eliminación aparente terminal fue de aproximadamente 2,4 horas. Aproximadamente el 80% de la dosis de pirfenidona administrada por vía oral se elimina en la orina en las 24 horas siguientes a su administración. La mayor parte de pirfenidona se excreta en forma del metabolito 5-carboxi-pirfenidona (del cual se recupera más del 95%), excretándose intacta en la orina menos del 1% de pirfenidona.

Poblaciones especiales
Pacientes con insuficiencia hepática
Se comparó la farmacocinética de pirfenidona y del metabolito 5-carboxi-pirfenidona en sujetos con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh) y en sujetos con función hepática normal. Los resultados indicaron un aumento medio del 60% en la exposición a pirfenidona después de administrar una dosis única de 801 mg de pirfenidona (3 cápsulas duras de 267 mg) en pacientes con insuficiencia hepática moderada. Pirfenidona debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada y se debe vigilar estrechamente a los pacientes para detectar signos de toxicidad, especialmente si están tomando al mismo tiempo un inhibidor conocido de CYP1A2. Pirfenidona está contraindicado en la insuficiencia hepática grave y en la enfermedad hepática terminal.

Insuficiencia renal
No se observaron diferencias clínicamente relevantes en la farmacocinética de pirfenidona en sujetos con insuficiencia renal leve a grave, con respecto a los sujetos con función renal normal. El compuesto original se metaboliza predominantemente a 5-carboxi-pirfenidona, y la farmacocinética de este metabolito está alterada en sujetos con insuficiencia renal moderada a grave.
No obstante, la cantidad esperada de acumulación del metabolito en estado de equilibrio no es importante desde el punto de vista farmacodinámico, debido a que la semivida de eliminación terminal es de sólo 1-2 horas en estos sujetos. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada que estén recibiendo pirfenidona. Pirfenidona está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) o enfermedad renal terminal que requiere diálisis.
Los análisis farmacocinéticos de poblaciones realizados en 4 estudios en sujetos sanos o sujetos con insuficiencia renal, y en un estudio en pacientes con FPI, no han indicado efectos clínicamente relevantes de la edad, el género o el tamaño corporal en la farmacocinética de pirfenidona.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Deben realizarse pruebas de la función hepática antes de iniciar el tratamiento con pirfenidona.
Dosis recomendada: la dosis diaria recomendada de OXITINOL es de 801 mg (tres cápsulas de 267 mg) con alimentos, para un total de 2.403 mg/día. Las dosis deben tomarse a la misma hora todos los días.
Una vez iniciado el tratamiento, se debe aumentar gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis diaria recomendada de nueve cápsulas al día durante un período de 14 días, de la forma siguiente:
Días 1 a 7: una cápsula, tres veces al día (801 mg/día) con alimentos
Días 8 a 14: dos cápsulas, tres veces al día (1.602 mg/día) con alimentos
A partir del día 15: tres cápsulas, tres veces al día (2.403 mg/día) con alimentos
En ningún caso se recomiendan dosis superiores a 2.403 mg/día.

Modificación de dosis debido a efectos adversos
Los pacientes que interrumpan el tratamiento con OXITINOL durante 14 días consecutivos o más, deben reiniciar el tratamiento con un aumento gradual de la dosis durante las 2 primeras semanas hasta alcanzar la dosis diaria recomendada. Si el tratamiento se interrumpe durante menos de 14 días consecutivos, podrá reanudarse con la dosis previa a la interrupción sin necesidad de un aumento gradual.
Si el paciente experimenta reacciones adversas significantes, se deberá considerar una reducción de dosis temporal o interrupción del tratamiento hasta tanto se resuelvan los síntomas.

Ajustes de la dosis y otras consideraciones para un uso seguro
Efectos secundarios gastrointestinales: Si el paciente experimenta intolerancia al tratamiento debido a efectos secundarios gastrointestinales, se le debe recordar que tome el medicamento con alimentos. Si los síntomas persisten, se puede reducir la dosis de pirfenidona a 1-2 cápsulas duras (267 mg - 534 mg) 2 ó 3 veces al día con alimentos y aumentarla gradualmente hasta alcanzar la dosis diaria recomendada según el paciente la vaya tolerando. Si los síntomas persisten, es posible que haya que indicar al paciente que interrumpa el tratamiento durante 1 ó 2 semanas hasta la remisión de los síntomas.
Reacción o erupción cutánea por fotosensibilidad: Si el paciente experimenta una reacción o erupción cutánea por fotosensibilidad, se le debe recordar la recomendación de utilizar diariamente crema de protección solar y evitar la exposición al sol. Se puede reducir la dosis de pirfenidona a 3 cápsulas duras diarias (1 cápsula dura tres veces al día). Si persiste la erupción cutánea al cabo de 7 días, se debe suspender el tratamiento con pirfenidona durante 15 días y volver a aumentar gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis diaria recomendada de la misma forma que se hizo en el período inicial de incremento de la dosis.
Si el paciente experimenta una reacción o erupción cutánea intensa por fotosensibilidad, se le debe indicar que suspenda la medicación y consulte al médico. Una vez que remita la erupción cutánea, podrá reanudar el tratamiento con pirfenidona y aumentar gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis diaria recomendada siguiendo las indicaciones del médico.
Función hepática: En el caso de que se produzca una marcada elevación de las enzimas alanino y/o aspartato aminotransferasas (ALT/AST) con o sin elevación de la bilirrubina, se debe ajustar la dosis de pirfenidona o suspender el tratamiento siguiendo las indicaciones dadas en "advertencias".

Poblaciones especiales
Pacientes de edad avanzada
No es necesario ajustar la dosis en pacientes de 65 años de edad o mayores.

Pacientes con insuficiencia hepática
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (es decir, clases A y B de Child-Pugh). No obstante, las concentraciones plasmáticas de pirfenidona pueden estar elevadas en algunos pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada, por lo que se recomienda precaución cuando se administre el tratamiento con pirfenidona en esta población. Se debe vigilar estrechamente a los pacientes para detectar signos de toxicidad, especialmente si están tomando al mismo tiempo un inhibidor conocido de CYP1A2. Pirfenidona no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave o enfermedad hepática terminal, por lo que no debe utilizarse en pacientes con esos trastornos. Se recomienda vigilar la función hepática durante el tratamiento y realizar los ajustes necesarios de la dosis en caso de elevación de las enzimas hepáticas.

Insuficiencia renal
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. No se recomienda el tratamiento con pirfenidona en pacientes con insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) o enfermedad renal terminal que precise diálisis.

Población pediátrica
Pirfenidona no debe usarse en la población pediátrica para la indicación de FPI.

Forma de administración
Pirfenidona debe tragarse entero con agua y con alimentos para reducir la posibilidad de náuseas y mareos.

Ajuste de dosis debido a interacciones medicamentosas
Inhibidores fuertes del CYP1A2: Reducir la dosis a 1 cápsula 3 veces al día.
Inhibidores moderados del CYP1A2: Reducir la dosis a 2 cápsulas 3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Antecedentes de angioedema con pirfenidona.
- Uso concomitante de fluvoxamina.
- Insuficiencia hepática grave o enfermedad hepática terminal.
- Insuficiencia renal grave (CrCl < 30 ml/min) o enfermedad renal terminal que precise diálisis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Función hepática
Se han descrito elevaciones de la ALT y AST más de tres veces por encima del límite superior de la normalidad (LSN) en pacientes que estaban recibiendo tratamiento con pirfenidona. Se deben realizar pruebas de la función hepática (ALT, AST y bilirrubina) antes del inicio del tratamiento con pirfenidona, a intervalos mensuales durante los primeros 6 meses y posteriormente cada 3 meses. Si se produce una marcada elevación de las aminotransferasas hepáticas, se debe ajustar la dosis de pirfenidona o suspender el tratamiento siguiendo las indicaciones anteriores. En pacientes con elevaciones confirmadas de ALT, AST o bilirrubina durante el tratamiento, puede que haya que realizar los siguientes ajustes de la dosis:

Recomendaciones en pacientes con elevación de ALT/AST
Si el paciente presenta elevaciones de las aminotransferasas entre >3 y ≤5 veces el LSN después de iniciar el tratamiento con pirfenidona se debe suspender cualquier medicamento que pueda interferir con el del estudio, descartar otras causas y vigilar de cerca al paciente. Si está médicamente indicado, se debe reducir o interrumpir la dosis de pirfenidona. Cuando las pruebas de la función hepática vuelvan a estar dentro de los límites normales, se podrá aumentar de nuevo gradualmente la dosis de pirfenidona hasta alcanzar la dosis diaria recomendada si es que el paciente la tolera.
Si el paciente presenta elevaciones de las aminotransferasas ≤5 veces el LSN, acompañadas de síntomas o hiperbilirrubinemia, se debe suspender el tratamiento con pirfenidona y no volver a reanudarlo en ese paciente.
Si el paciente presenta elevaciones de las aminotransferasas > 5 veces por encima del LSN, acompañadas de síntomas o hiperbilirrubinemia, se debe suspender el tratamiento con pirfenidona y no volver a reanudarlo en ese paciente.

Pacientes con insuficiencia hepática
En pacientes con insuficiencia hepática moderada (es decir, clase B de Child-Pugh), la exposición a pirfenidona aumentó un 60%. Se recomienda precaución cuando se administre pirfenidona a pacientes con antecedentes de insuficiencia hepática leve o moderada (es decir, clases A y B de Child-Pugh) debido a la posibilidad de una mayor exposición a este medicamento. Se debe vigilar estrechamente a los pacientes para detectar signos de toxicidad, especialmente si están tomando al mismo tiempo un inhibidor conocido de CYP1A2. Pirfenidona no se ha estudiado en personas con insuficiencia hepática grave, por lo que no se recomienda su administración a esos pacientes.

Reacción o erupción cutánea por fotosensibilidad
Durante el tratamiento con pirfenidona se debe evitar o reducir al mínimo la exposición directa al sol (y a lámparas de rayos UVA). Se debe indicar a los pacientes que usen diariamente cremas de protección solar y ropa que les proteja de la exposición al sol, y que eviten otros medicamentos que se sabe que causan fotosensibilidad. El paciente debe informar al médico si presenta síntomas de reacción o erupción cutánea por fotosensibilidad. Las reacciones graves de fotosensibilidad son poco frecuentes. En los casos leves o graves de reacción o erupción cutánea por fotosensibilidad, es posible que haya que ajustar la dosis o interrumpir temporalmente el tratamiento.

Angioedema
Se han recibido notificaciones de angioedema (algunas graves), como hinchazón de la cara, labios y/o lengua que pueden estar asociadas con dificultad para respirar o respiración sibilante, relacionadas con el uso de pirfenidona tras la comercialización. Por lo tanto, los pacientes que desarrollen signos o síntomas de angioedema tras la administración de pirfenidona deben suspender inmediatamente el tratamiento. Los pacientes con angioedema se deben tratar de acuerdo con las normas asistenciales. Pirfenidona no se debe utilizar en pacientes con antecedentes de angioedema debido a que esta misma constituye una contraindicación.

Mareos
Se ha descrito mareos en pacientes tratados con pirfenidona. Por consiguiente, los pacientes deben saber cómo reaccionan a este medicamento antes de realizar actividades que les exijan atención o coordinación. En los estudios clínicos, la mayoría de los pacientes que experimentaron mareos tuvieron un único episodio, y la mayoría de esos episodios se resolvieron, con una mediana de duración de 22 días. Si los mareos no mejoran o se hacen más intensos, es posible que haya que ajustar la dosis o incluso interrumpir el tratamiento con pirfenidona.

Cansancio
Se ha descrito cansancio en pacientes tratados con pirfenidona. Por consiguiente, los pacientes deben saber cómo reaccionan a este medicamento antes de realizar actividades que les exijan atención o coordinación.

Pérdida de peso
Se ha descrito pérdida de peso en pacientes tratados con pirfenidona. El médico debe vigilar el peso del paciente y, cuando lo considere oportuno, recomendarle que aumenten la ingesta calórica si considera que la pérdida de peso tiene relevancia clínica.

Interacciones con otros medicamentos
Aproximadamente el 70-80% de pirfenidona es metabolizada mediante CYP1A2, y en menor proporción por otras isoenzimas CYP, como CYP2C9, 2C19, 2D6 y 2E1.
El consumo de zumo de pomelo se ha relacionado con la inhibición de CYP1A2 y debe evitarse durante el tratamiento con pirfenidona.

Fluvoxamina e inhibidores del CYP1A2
En un estudio en fase 1, la administración conjunta de pirfenidona y fluvoxamina (un potente inhibidor de CYP1A2 que también tiene efectos inhibidores en otras isoenzimas CYP [CYP2C9, 2C19 y 2D6] multiplicó por cuatro la exposición a pirfenidona en pacientes no fumadores.
Pirfenidona está contraindicado en pacientes que estén tomando también fluvoxamina. Debe suspenderse el tratamiento con fluvoxamina antes de iniciar el tratamiento con Pirfenidona y durante todo el tiempo que dure éste, puesto que reduce el aclaramiento de pirfenidona. Durante el tratamiento con pirfenidona deben evitarse también otros tratamientos inhibidores tanto de CYP1A2 como de una o más de las otras isoenzimas CYP que intervienen en el metabolismo de pirfenidona (como CYP2C9, 2C19 y 2D6).
Extrapolaciones in vitro e in vivo indican que los inhibidores potentes y selectivos de CYP1A2 (p. ej, enoxacina) tienen potencial para aumentar la exposición a pirfenidona en aproximadamente 2 a 4 veces.
Si no se puede evitar el uso concomitante de pirfenidona con un inhibidor potente y selectivo de CYP1A2, la dosis de pirfenidona debe reducirse a 801 mg al día (una cápsula dura, tres veces al día). Los pacientes deben ser estrechamente monitorizados por si aparecieran reacciones adversas relacionadas con el tratamiento con pirfenidona. Suspenda el tratamiento con pirfenidona si fuera necesario.
La administración conjunta de pirfenidona y ciprofloxacino de 750 mg (un inhibidor moderado del CYP1A2) aumentó la exposición a pirfenidona en un 81%. Si no se puede evitar utilizar ciprofloxacino a la dosis de 750 mg dos veces al día, la dosis de pirfenidona debe reducirse a 1602 mg al día (dos cápsulas duras, tres veces al día).

Pirfenidona debe utilizarse con precaución también cuando se utiliza ciprofloxacino a una dosis de 250 mg o 500 mg una vez o dos veces al día.
Pirfenidona debe utilizarse con precaución en pacientes tratados con otros inhibidores moderados de CYP1A2 (p.ej. amiodarona o propafenona).
Se recomienda especial precaución cuando se administren inhibidores de CYP1A2 conjuntamente con inhibidores potentes de una o más de las otras isoenzimas CYP que intervienen en el metabolismo de pirfenidona, como CYP2C9 (p. ej., amiodarona, fluconazol), 2C19 (p. ej., cloranfenicol) y 2D6 (p. ej., fluoxetina, paroxetina).

Otras formas de interacción
Tabaco e inductores de CYP1A2
Un estudio de interacción en fase 1 evaluó el efecto del tabaco (inductor de CYP1A2) en la farmacocinética de pirfenidona. La exposición a pirfenidona fue un 50% menor en los fumadores que en los no fumadores. El tabaco puede inducir la producción de enzimas hepáticas y, con ello, aumentar el aclaramiento del medicamento y reducir la exposición al mismo.
Durante el tratamiento con pirfenidona se debe evitar el uso concomitante de inductores potentes de CYP1A2, como el tabaco, puesto que se ha observado una relación entre el tabaco y la posible inducción de CYP1A2. Se debe recomendar a los pacientes que dejen de tomar inhibidores potentes del CYP1A2 y que no fumen antes ni durante el tratamiento con pirfenidona.
El uso concomitante de inductores moderados de CYP1A2 (como omeprazol) puede, en teoría, reducir las concentraciones plasmáticas de pirfenidona.
La administración simultánea de otros medicamentos que actúan como inductores potentes tanto de CYP1A2 como de las otras isoenzimas CYP que intervienen en el metabolismo de pirfenidona (como rifampicina) puede producir un marcado descenso de las concentraciones plasmáticas de pirfenidona. Esos otros medicamentos deben evitarse en la medida de lo posible.

Embarazo
No hay datos relativos al uso de pirfenidona en mujeres embarazadas.
En animales, pirfenidona y/o sus metabolitos atraviesan la placenta y pueden acumularse en el líquido amniótico.
En ratas que recibieron dosis altas (≥ 1.000 mg/kg al día), se prolongó la gestación y se redujo la viabilidad fetal.
Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de pirfenidona durante el embarazo.

Lactancia
Se desconoce si pirfenidona o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacocinéticos disponibles en animales han demostrado la excreción de pirfenidona o sus metabolitos en la leche y la posible acumulación de pirfenidona o sus metabolitos en la leche. No se puede excluir un riesgo para el lactante.
Se tiene que tomar la decisión de interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con pirfenidona, tras sopesar el beneficio de la lactancia para el niño frente al beneficio del tratamiento con pirfenidona para la madre.

Fertilidad
No se han observado efectos perjudiciales para la fertilidad en los estudios preclínicos.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad:
Carcinogénesis: Se desconoce la trascendencia con respecto al riesgo potencial en los seres humanos.
Mutagénesis: La pirfenidona no fue mutagénica ni clastogénica en los siguientes ensayos: pruebas de mutagenicidad en bacterias, prueba de aberración cromosómica en células de pulmón de hámster chino, y prueba de micro núcleos en ratones.
Deterioro de la fertilidad: La pirfenidona no tuvo efectos en la fertilidad ni en el desempeño reproductivo de las ratas con dosis de hasta 1.000 mg/kg/día (aproximadamente 3 veces la dosis máxima recomendada en humanos sobre una base de mg/m^2).

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Pirfenidona puede causar mareo y cansancio, por lo que puede afectar a la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

REACCIONES ADVERSAS
Se registraron reacciones adversas graves con frecuencias similares entre los pacientes tratados con 2.403 mg/día de pirfenidona y placebo en estudios clínicos.
En la Tabla 1 se recogen las reacciones adversas notificadas con una frecuencia igual o superior al 2% en 345 pacientes que recibieron pirfenidona a la dosis recomendada de 2.403 mg/día en dos estudios fundamentales en fase 3.

Las reacciones adversas se ordenan por la clasificación de órganos y sistemas y, dentro de cada categoría de frecuencia [Muy frecuentes (≥1/10), Frecuentes (≥1/100 a <1/10)], se presentan en orden decreciente de gravedad.
La seguridad de pirfenidona se ha evaluado en estudios clínicos realizados en 1.650 voluntarios y pacientes. Se ha realizado seguimiento a más de 170 pacientes en estudios abiertos durante un periodo superior a cinco años, llegando, en algunos casos, a diez.
Las reacciones adversas observadas con más frecuencia (≥10%) durante la experiencia del estudio clínico que comparó pirfenidona a la dosis de 2.403 mg/día con placebo fueron, respectivamente, las siguientes: náuseas (32,4% frente al 12,2%), erupción cutánea (26,2% frente al 7,7%), diarrea (18,8% frente al 14,4%), cansancio (18,5% frente al 10,4%), dispepsia (16,1% frente al 5,0%), anorexia (11,4% frente al 3,5%), cefalea (10,1% frente al 7,7%) y reacción por fotosensibilidad (9,3% frente al 1,1%).

Tabla 1 Reacciones adversas ordenadas por frecuencia y clasificación de órganos del sistemas MedDRA	
Infecciones e infestaciones	
Frecuentes	Infección de las vías respiratorias altas; infección de las vías urinarias
Trastornos del sistema inmunológico	
Poco frecuentes	Angioedema -1
Trastornos de la sangre y sistema linfático	
Raro	Agranulocitosis -1
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	
Frecuentes	Pérdida de peso, anorexia, pérdida de apetito
Trastornos psiquiátricos	
Frecuentes	Insomnio
Trastornos del sistema nervioso	
Frecuentes	Mareo, dolor de cabeza, somnolencia, disgeusia
Trastornos vasculares	
Frecuentes	Sofocos
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	
Frecuentes	Disnea, tos, tos productiva
Trastornos gastrointestinales	
Muy frecuentes	Dispepsia, náuseas, diarrea
Frecuentes	Enfermedad por reflujo gastroesofágico, vómitos, distensión abdominal, molestias abdominales, dolor abdominal, dolor en la parte alta del abdomen, malestar de estómago, gastritis, estreñimiento, flatulencia
Trastornos hepatobiliares	
Frecuentes	Elevación de ALT, elevación de AST, elevación de gamma glutamil transferasa
Raros	Elevación de la bilirrubina sérica total en combinación con elevaciones de la ALT y AST1
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	
Muy frecuentes	Reacción o erupción cutánea por fotosensibilidad
Frecuentes	Prurito, eritema, sequedad de piel, erupción eritematosa, erupción macular, erupción pruriticа
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	
Frecuentes	Mialgia, artralgia
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	
Muy frecuentes	Cansancio
Frecuentes	Astenia, dolor torácico no cardíaco
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos	
Frecuentes	Quemaduras solares

1. Identificado a través de farmacovigilancia post - comercialización
Notificación de sospechas de reacciones adversas :Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación de eventos Adversos ANMAT. http://sistemas.anmat.gov.ar/aplicaciones_net/applications/fvg_eventos_adversos_nuevo/index.html

SOBREDOSIFICACIÓN
Existe una experiencia clínica limitada con las sobredosis. Se administraron varias dosis de pirfenidona hasta un total de 4.806 mg/día en forma de seis cápsulas duras de 267 mg tres veces al día a voluntarios adultos sanos durante un período de aumento gradual de la dosis de 12 días. Las reacciones adversas fueron leves, transitorias y compatibles con las reacciones adversas observadas con más frecuencia con pirfenidona.
Si se sospecha una sobredosis, debe proporcionarse asistencia médica de apoyo, con vigilancia de las constantes vitales y una estrecha observación de la situación clínica del paciente.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 654-6648/658-7777.

En Uruguay: C.I.A.T., Tel.: 1722.

En Paraguay: En caso de intoxicación por sobredosificación, recurrir al Centro Nacional de Toxicología.
Av. Gral. Santos y T. S. Mongelos - Tel.: 205 800.

Conservación
Debe mantenerse a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, en ausencia de luz, en su envase original.

Presentación
Envase conteniendo 63 capsulas para inicio de tratamiento.
Envase conteniendo 63 capsulas para mantenimiento de tratamiento.
Envase conteniendo 252 capsulas para mantenimiento de tratamiento.
Frasco conteniendo 270 cápsulas.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

"Este medicamento debe ser administrado sólo bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica..."

***"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No se lo recomiende a otras personas."***

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MEDICO

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

000000-R

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado Nº 58069

LKM
Absolutamente Confiable

Elaborado por: VICROFER S.R.L.,
Santa Rosa 3676, San Fernando,Provincia de Buenos Aires.
Para: Laboratorio LKM S.A.
Lynch 3461/63, CABA
Dirección Técnica: Dr. Eduardo Bruzzone – Farmacéutico.

Asunción, 30 de marzo de 2020

NOTA CE N° 15 /2020

EL ÁLAMO S.A.
Sacramento 280 c/Olegario Andrade
(021) 607 474 - (021) 443657
pharma@elalamo.com.py ; mariacaniza@elalamo.com.py

Presente:

Ref.: "LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" - ID 373.874.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en el marco de la LPN de referencia, con el objeto de solicitar la presentación de las muestras de los ítems que se detallan a continuación:

EL ÁLAMO S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia
3	AZACITIDINA 100 MG INYECTABLE	Unidad	VIAL	ARQUIMES	ARGENTINA
9	IRINOTECAN 100 MG INYECTABLE	Unidad	AMPOLLA	SATIGENE	ARGENTINA
15	TEMOZOLAMIDA 100 MG	Unidad	UNIDAD	TEZULINA 100	ARGENTINA

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado el día Miercoles **01 de abril de 2020, desde las 08:00 hasta las 09:30 horas**. **Transcurrido dicho plazo no se recibirá ninguna muestra.**

Para una mejor comodidad de los oferentes y una mayor eficiencia en la recepción y evaluación de muestras presentadas, el lugar de presentación de las mismas **será en la Planta Baja del Edificio de la DIBEN.**

Atentamente,

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Miembro del Comité de Evaluación

El Alamo S.A.
Farm & Health Care Products For a New Age

Asunción, 01 de ABRIL de 2020.-

Ref.: "LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales - Ad Referéndum a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020 y al Plan Financiero 2020"ID 373.874.-

A: **Comité de Evaluación**
EE.UU N° 135 entre José Berges y Mcal. López
Tel. (021) 225-801/4
Asunción – Paraguay

De mi consideración:

En nombre y representación de la firma **EL ALAMO S.A.** presento muestras de los productos ofertados en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2020, que es el siguiente:

EL ALAMO S.A.
Lista de Muestras Presentadas

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia
3	Azacitidina 100 mg Polvo Liof. p/ Inyectable	Unidad	Fco. Ampolla c/ Polvo Liofilizado p/ Inyectables.	Arquimes	Argentina
9	Irinotecan 100 mg Inyectable	Unidad	Fco. Ampolla. Solución Inyectable	Satigene	Argentina
15	Temozolomida 100 mg Cápsulas	Unidad	Cápsulas	Tezulina 100	Argentina

Atentamente,

Firma:
Nombre: **Q.F. Alice Ramírez**
Dpto. Regulatorio
EL ALAMO S.A.

Recibido
08:27
01/04/2020

Human Health Care Division
Pharmaceutical - Diagnostic - Hospitalar
Bendlin Group

Sacramento 280
c/ Olegario Andrade
Tel/Fax: (+595 21) 604-346 / 607-471
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de marzo de 2020

NOTA CE N° 16 /2020

BIOETHIC PHARMA S.A.
Tacuarí N° 221 esq. Dr. Eligio Ayala
(021) 493032/4 - (0971) 169266
gerardo.fines@bioethicpharma.com.py ;
edgar.villalba@bioethicpharma.com.py

Presente:

Ref.: "LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" - ID 373.874.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en el marco de la LPN de referencia, con el objeto de solicitar la presentación de las muestras de los ítems que se detallan a continuación:

BIOETHIC PHARMA S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia
7	ERLOTINIB 150 MG	Unidad	UNIDAD	ERLOTINIB 150 mg VARIFARMA	ARGENTINA
21	INFLIXIMAB 100 MG INYECTABLE	Unidad	VIAL	REMSIMA 100 mg	COREA/TURQUÍA

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado el día Miercoles **01 de abril de 2020, desde las 08:00 hasta las 09:30 horas**. **Transcurrido dicho plazo no se recibirá ninguna muestra.**

Para una mejor comodidad de los oferentes y una mayor eficiencia en la recepción y evaluación de muestras presentadas, el lugar de presentación de las mismas **será en la Planta Baja del Edificio de la DIBEN.**

Atentamente,

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

Miembro del Comité de Evaluación

BIOETHIC pharma S.A.

Asunción 1 de abril de 2020.-

Señores
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social – DIBEN
Atte. Miembros del Comité de Evaluación
Dirección: *Avda. EE.UU. N° 135 casi Avda. Mariscal López*
Asunción, Paraguay

Nos dirigimos a ustedes, con relación al llamado ***Licitación Pública Nacional N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales – Ad Referéndum a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2020 y el Plan Financiero 2020" – ID 373.874***, *para entregar los siguientes medicamentos para muestras:* (Nota N 16/2020)

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia
7	Erlotinib 150 MG Comprimido	Unidad	UNIDAD	***ERLOTINIB 150 mg VARIFARMA***	***Argentina***
21	Infliximab 100 MG Inyectable	Unidad	VIAL	***REMSIMA 100 mg***	***Corea/Turqía***

Sin otro particular motivo, hallo propicia la ocasión para saludarles cordialmente. –

Miguel Ugon
2088083

Gerardo Fines
Licitaciones
BIOETHIC pharma S.A.

01/04/2020
08:07

Asunción, 30 de marzo de 2020

NOTA CE N° 17 /2020

QUIMFA S.A.
Avda. Primer Presidnte N° 1,736 e/Yrendague.
(021) 289 4000 Int. 393
instituciones@quimfa.com.py

Presente:

Ref.: "LPN N° 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" - ID 373.874.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., en el marco de la LPN de referencia, con el objeto de solicitar la presentación de las muestras de los ítems que se detallan a continuación:

QUIMFA S.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRESENTACIÓN	Marca	Procedencia
1	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG INYECTABLE	Unidad	VIAL	EXETIDE 5	NACIONAL
19	ERITROPOYETINA 4.000 UI	Unidad	KIT- JUEGO	ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE TIPO ALFA 4000 UI/ML QUIMFA	CUBA
22	INMUNOGLOBULINA G HUMANA 10% INYECTABLE	Unidad	VIAL	PRIVIGEN	SUIZA

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado el día Miercoles **01 de abril de 2020, desde las 08:00 hasta las 09:30 horas**. **Transcurrido dicho plazo no se recibirá ninguna muestra.**

Para una mejor comodidad de los oferentes y una mayor eficiencia en la recepción y evaluación de muestras presentadas, el lugar de presentación de las mismas **será en la Planta Baja del Edificio de la DIBEN.**

Atentamente,

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

Miembro del Comité de Evaluación

QUIMFA
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS - PRODUCTOS QUIMICOS - DROGAS
Planta Industrial: Primer Presidente 1736 c/ Yrendague • **Teléfono:** (595-21) 289 4000• **Email:** marketing@quimfa.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 01 de abril de 2020

Señores
A Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN)
Avda. EE.UU. Nº 135 casi Avda. Mariscal López
Presente

De nuestra consideración:

En vista a su **Nota CE Nº 17/2020** con fecha **30/03/20**, emitida en el marco de la **LPN Nº 01/2020 "Adquisición de Medicamentos Oncológicos y Generales" ID Nº 373.874**, dónde nos solicitan muestras de los siguientes productos:

Ítem	Descripción	U.M.	Presentación	Marca	Procedencia
1	Acido Zoledronico 5mg. Inyectable.	Unidad	Vial	Exetide 5	Nacional
19	Eritropoyetina 4.000UI	Unidad	Kit - Juego	Eritropoyetina Humana Recombinante Tipo Alfa 4000UI/mL. Quimfa	Cuba
22	Inmunoglobulina G. Humana 10%. Inyectable.	Unidad	Vial	Privigen	Suiza

Adjuntamos las muestras solicitadas.

Atte,

QUIMFA
C.P. Claudia Raquel Barrios
C.I. 1.717.929
Apoderada

Recibido.

08:40
01/04/2020.